

# Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΛΓΕΒΡΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2<sup>ο</sup>: «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ»

Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):

1. Σωστό
2. Σωστό
3. Σωστό
4. Λάθος
5. Σωστό
6. Λάθος
7. Σωστό
8. Λάθος
9. Σωστό
10. Λάθος
11. Λάθος
12. Λάθος
13. Σωστό
14. Σωστό
15. Σωστό
16. Λάθος
17. Λάθος
18. Σωστό
19. Σωστό
20. Σωστό
21. Λάθος
22. Λάθος
23. Λάθος
24. Σωστό
25. Σωστό
26. Σωστό
27. Σωστό
28. Λάθος
29. Σωστό
30. Σωστό
31. Σωστό
32. Λάθος
33. Λάθος
34. Σωστό
35. Λάθος
36. Λάθος

37. Λάθος

38. Σωστό

39. Σωστό

40. Σωστό

41. Σωστό

42. Λάθος

43. Σωστό

**Επιμέλεια: Βασιλάτος Κοσμάς**

### ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

**Τα παρακάτω θέματα αποτελούν βασικές γνώσεις στο 2<sup>ο</sup> Κεφάλαιο**

1.

#### ΛΥΣΗ

α) Έχουμε:

$$A = \frac{(x^2y^{-1})^3}{xy} : \frac{(x^2y)^4(x^3y^2)^{-1}}{(y^4x)^2} = \frac{x^6y^{-3}}{xy} : \frac{x^8y^4x^{-3}y^{-2}}{y^8x^2} =$$

$$x^5y^{-4} : \frac{x^5y^2}{y^8x^2} = x^5y^{-4} : x^3y^{-6} = x^2y^2 = (xy)^2 \quad (1)$$

β)

- Για  $x = 2020$  και  $y = \frac{1}{2020}$  αντικαθιστώντας στην (1) έχουμε:

$$A = \left( 2020 \cdot \frac{1}{2020} \right)^2 = 1^2 = 1$$

2.

#### ΛΥΣΗ

$$A = \left( \frac{xy^{-1}}{z^2} \right)^2 : \left( \frac{x^{-3}z^4}{y^2} \cdot \frac{y^3z^2}{z^{-3}x^2} \right) =$$

$$\frac{x^2y^{-2}}{z^4} : \left( \frac{x^{-3}z^4}{y^2} \cdot \frac{z^{-3}x^2}{y^3z^2} \right) =$$

$$\frac{x^2y^{-2}}{z^4} : \frac{x^{-1}z^{-1}}{y^5} =$$

$$\frac{x^2y^{-2}}{z^4} \cdot \frac{y^5}{x^{-1}z^{-1}} =$$

$$\frac{x^3y^3}{z^3} = \left( \frac{xy}{z} \right)^3$$

Για  $x = -6$ ,  $y = 1,5$ ,  $z = 9$

$$A = \left( \frac{xy}{z} \right)^3 = \left( \frac{-6 \cdot 1,5}{9} \right)^3 = (-1)^3 = -1$$

3.

### ΛΥΣΗ

α) Έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= \frac{(\alpha - \beta)^2 + 3\alpha\beta}{\alpha^3 - \beta^3} = \\ &= \frac{\alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 + 3\alpha\beta}{(\alpha - \beta)(\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2)} = \\ &= \frac{\cancel{\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2}}{(\alpha - \beta)(\cancel{\alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2})} = \frac{1}{\alpha - \beta} \quad (1) \end{aligned}$$

β) Για  $\alpha = 2020$  και  $\beta = 2019$  αντικαθιστώντας στην (1) έχουμε:

$$A = \frac{1}{2020 - 2019} = \frac{1}{1} = 1$$

4.

### ΛΥΣΗ

$$\text{α) } (\alpha^2 + \beta^2)(x^2 + y^2) = (\alpha x + \beta y)^2 + (\alpha y - \beta x)^2 \Leftrightarrow$$

$$\alpha^2 x^2 + \alpha^2 y^2 + \beta^2 x^2 + \beta^2 y^2 = \cancel{\alpha^2 x^2 + 2\alpha x \beta y} + \beta^2 y^2 + \alpha^2 y^2 \cancel{- 2\alpha x \beta y} + \beta^2 x^2 \Leftrightarrow$$

$$\alpha^2 x^2 + \alpha^2 y^2 + \beta^2 x^2 + \beta^2 y^2 = \alpha^2 x^2 + \beta^2 y^2 + \alpha^2 y^2 + \beta^2 x^2$$

$$\text{β) } \alpha(\alpha - 2\beta)^3 - \beta(\beta - 2\alpha)^3 = (\alpha^2 - \beta^2)(\alpha + \beta)^2 \Leftrightarrow$$

$$\begin{aligned} \alpha(\alpha^3 - 6\alpha^2\beta + 12\alpha\beta^2 - 8\beta^3) - \beta(\beta^3 - 6\beta^2\alpha + 12\beta\alpha^2 - 8\alpha^3) &= (\alpha^2 - \beta^2)(\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2) \Leftrightarrow \\ \cancel{\alpha^4 - 6\alpha^3\beta + 12\alpha^2\beta^2 - 8\alpha\beta^3} - \cancel{\beta^4 + 6\beta^3\alpha - 12\beta^2\alpha^2 + 8\alpha^3\beta} &= \cancel{\alpha^4 + 2\alpha^3\beta + \alpha^2\beta^2 - \alpha^2\beta^2} - 2\alpha\beta^3 \cancel{- \beta^4} \Leftrightarrow \\ + 2\alpha^3\beta - 2\alpha\beta^3 &= + 2\alpha^3\beta - 2\alpha\beta^3 \end{aligned}$$

5.

**ΛΥΣΗ**

$$\text{α)} \quad (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = \alpha^2 + 2\cancel{\alpha\beta} + \beta^2 - \cancel{2\alpha\beta} = \alpha^2 + \beta^2$$

$$\text{β)} \quad (\alpha - \beta)^2 + 2\alpha\beta = \alpha^2 - 2\cancel{\alpha\beta} + \beta^2 + \cancel{2\alpha\beta} = \alpha^2 + \beta^2$$

$$\gamma) \quad (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) =$$

$$\alpha^3 + 3\cancel{\alpha^2\beta} + \cancel{3\alpha\beta^2} + \beta^3 - 3\cancel{\alpha^2\beta} - \cancel{3\alpha\beta^2} =$$

$$\alpha^3 + \beta^3$$

$$\delta) \quad (\alpha - \beta)^3 + 3\alpha\beta(\alpha - \beta) =$$

$$\alpha^3 - 3\cancel{\alpha^2\beta} + \cancel{3\alpha\beta^2} - \beta^3 + 3\cancel{\alpha^2\beta} - \cancel{3\alpha\beta^2} =$$

$$\alpha^3 - \beta^3$$

6.

**ΛΥΣΗ**

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 =$$

$$x^2 + 2x \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - \left(x^2 - 2x \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right) =$$

$$x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} - x^2 + 2 - \frac{1}{x^2} = 4$$

7.

**ΛΥΣΗ**

Αφού  $x - y = -2 \Leftrightarrow x = y - 2$  τότε έχουμε:

$$x^3 - 2x^2 - y^3 + 8y^2 - 20y =$$

$$(y - 2)^3 - 2(y - 2)^2 - y^3 + 8y^2 - 20y =$$

$$y^3 - 6y^2 + \cancel{12y} - 8 - \cancel{2y^2} + \cancel{8y} - 8 - \cancel{y^3} + \cancel{8y^2} - \cancel{20y} = -16$$

8.

**ΛΥΣΗ**

Από ταυτότητα του Euler ισχύει ότι αν:

$$\alpha + \beta + \gamma = 0 \Rightarrow \alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 3\alpha\beta\gamma.$$

Τότε:

$$A = \frac{\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3}{\alpha \cdot \beta \cdot \gamma} = \frac{3\alpha \cdot \beta \cdot \gamma}{\alpha \cdot \beta \cdot \gamma} = 3$$

9.

**ΛΥΣΗ**

$$\text{a)} \frac{x^2+x+1}{x+1} \cdot \frac{x^2-1}{x^3-1} = \frac{\cancel{x^2+x+1}}{\cancel{x+1}} \cdot \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(\cancel{x^2+x+1})} = 1$$

$$\text{b)} \frac{y(y-2)+1}{(y-2)(y-1)} = \frac{y^2-2y+1}{(y-2)(y-1)} = \frac{(y-1)^2}{(y-2)(y-1)} = \frac{(y-1)}{(y-2)}$$

$$\text{γ)} \frac{\omega^2-1}{\omega^2+3\omega} \cdot \frac{\omega^2+\omega}{2\omega^3+6\omega^2} = \frac{(\omega-1)(\omega+1)}{\omega(\omega+3)} \cdot \frac{2\omega^2(\omega+3)}{\omega(\omega+1)} = 2(\omega-1)$$

10.

**ΛΥΣΗ**

'Έχουμε:

$$\alpha(\alpha+6) = \beta(2-\beta) - 10 \Leftrightarrow$$

$$\alpha^2 + 6\alpha = 2\beta - \beta^2 - 10 \Leftrightarrow$$

$$\alpha^2 + 6\alpha + \beta^2 - 2\beta + 10 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\alpha^2 + 6\alpha + \beta^2 - 2\beta + 9 + 1 = 0 \Leftrightarrow$$

$$(\alpha^2 + 6\alpha + 9) + (\beta^2 - 2\beta + 1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$(\alpha + 3)^2 + (\beta - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha + 3 = 0 \\ \beta - 1 = 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \alpha = -3 \text{ και } \beta = 1$$

11.

**ΛΥΣΗ**

$$\alpha(\alpha+6\beta) \geq \beta(4\alpha-\beta) \Leftrightarrow$$

$$\alpha^2 + 6\alpha\beta \geq 4\alpha\beta - \beta^2 \Leftrightarrow$$

$$\alpha^2 + 6\alpha\beta - 4\alpha\beta + \beta^2 \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$\alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 \geq 0 \Leftrightarrow (\alpha + \beta)^2 \geq 0,$$

που ισχύει για κάθε  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ .

12.

**ΛΥΣΗ**

a)  $\alpha + \frac{4}{\alpha} \geq 4 \stackrel{\cdot\alpha>0}{\Leftrightarrow} \alpha^2 + 4 \geq 4\alpha \Leftrightarrow \alpha^2 - 4\alpha + 4 \geq 0 \Leftrightarrow (\alpha - 2)^2 \geq 0$  που ισχύει.

β) Από ερώτημα (a) έχουμε:

$$\left. \begin{array}{l} \left( \alpha + \frac{4}{\alpha} \right) \geq 4 \\ \left( \beta + \frac{4}{\beta} \right) \geq 4 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{ολα τα μελη θετικα αρα} \\ \text{πολλαπλασιαζω κατα μελη} \end{array} \Leftrightarrow \left( \alpha + \frac{4}{\alpha} \right) \left( \beta + \frac{4}{\beta} \right) \geq 16$$

13.

**ΛΥΣΗ**

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \leq 2 \stackrel{\cdot xy < 0}{\Leftrightarrow} x^2 + y^2 \geq 2xy \Leftrightarrow x^2 - 2xy + y^2 \geq 0 \Leftrightarrow (x - y)^2 \geq 0$$

που ισχύει

14.

**ΛΥΣΗ**

a)  $2x^2 - 6x + 10 > 2xy - y^2 \Leftrightarrow$

$$\begin{aligned} x^2 + x^2 - 6x + 10 - 2xy + y^2 &> 0 \Leftrightarrow \\ x^2 - 2xy + y^2 + x^2 - 6x + 9 + 1 &> 0 \Leftrightarrow \\ (x - y)^2 + (x - 3)^2 + 1 &> 0 \end{aligned}$$

που ισχύει ως άθροισμα μη αρνητικών αριθμών.

β)  $x^2 + y^2 \geq xy \Leftrightarrow$

$$\begin{aligned} x^2 - xy + y^2 &\geq 0 \Leftrightarrow \\ 2x^2 - 2xy + 2y^2 &\geq 0 \Leftrightarrow \\ x^2 + x^2 - 2xy + y^2 + y^2 &\geq 0 \Leftrightarrow \\ x^2 + (x - y)^2 + y^2 &\geq 0 \end{aligned}$$

που ισχύει ως άθροισμα μη αρνητικών αριθμών

15.

**ΛΥΣΗ**

$$\begin{aligned} (x+1)^2 + y^2 \leq 4x - 3(2y+3) &\Leftrightarrow \\ x^2 + 2x + 1 + y^2 - 4x + 6y + 9 \leq 0 &\Leftrightarrow \\ x^2 - 2x + 1 + y^2 + 6y + 9 \leq 0 &\Leftrightarrow \\ (x-1)^2 + (y+3)^2 \leq 0 &\Leftrightarrow \\ \begin{cases} x-1=0 \\ y+3=0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=-3 \end{cases} \end{aligned}$$

16.

**ΛΥΣΗ**α) Από υπόθεση είναι  $0 < x < 1$  άρα

$$\begin{aligned} x < 1 &\stackrel{x>0}{\Leftrightarrow} x^2 < x \\ x^2 < x &\stackrel{x>0}{\Leftrightarrow} x^3 < x^2 \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \Rightarrow x^3 < x^2 < x \\ \Rightarrow x^3 < x \end{array} \right\}$$

β) Από υπόθεση είναι  $0 < x < 1 \stackrel{x>0}{\Leftrightarrow} 1 < \frac{1}{x}$  και από ερώτημα (α) έχουμε τελικά:

$$0 < x^3 < x < 1 < \frac{1}{x}$$

17.

**ΛΥΣΗ**

- Είναι :

$$1 \leq x \leq 3 \Rightarrow 1^2 \leq x^2 \leq 3^2 \Rightarrow 1 \leq x^2 \stackrel{(3)}{\leq} 9 \Rightarrow 3 \leq 3x^2 \leq 27 \quad (1)$$

- Ομοίως:

$$-2 \leq y \leq 0 \stackrel{(-2)}{\Rightarrow} 4 \geq -2y \geq 0 \Rightarrow 0 \leq -2y \leq 4 \quad (2)$$

- Από τις σχέσεις (1) και (2), προσθέτοντας κατά μέλη, έχουμε:

$$3 \leq 3x^2 - 2y \leq 31$$

18.

## ΛΥΣΗ

a)

- Είναι :

$$1 < x < 4 \Rightarrow 1 < x^2 < 16 \quad (1)$$

- Ομοίως:

$$2 < y < 3 \Rightarrow -4 > -2y > -6 \Rightarrow -6 < -2y < -4 \quad (2)$$

- Από τις σχέσεις (1) και (2), προσθέτοντας κατά μέλη, έχουμε:

$$-5 < x^2 - 2y < 12$$

β)

- Είναι:

$$1 < x < 4 \quad (3)$$

$$2 < y < 3 \quad (4)$$

- Από τις σχέσεις (3) και (4), πολλαπλασιάζοντας κατά μέλη αφού όλα είναι θετικά, έχουμε:

$$2 < xy < 12 \Leftrightarrow -2 < \frac{4}{xy} - 4 < 8$$

γ)

- Είναι:

$$1 < x < 4 \Rightarrow \frac{1}{x} > \frac{1}{4} > \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{4} < \frac{1}{x} < 1 \quad (5)$$

- Από τις σχέσεις (2) και (5), προσθέτοντας κατά μέλη, έχουμε:

$$\frac{1}{4} - 6 < \frac{1}{x} - 2y < 1 - 4 \Leftrightarrow -\frac{23}{4} < \frac{1}{x} - 2y < -3$$

19.

## ΛΥΣΗ

a)

- Είναι:

$$1 < \alpha < 3 \quad (1)$$

$$-2 < \beta < -1 \Rightarrow 2 > -\beta > 1 \Rightarrow 1 < -\beta < 2 \quad (2)$$

- Από τις σχέσεις (1) και (2), πολλαπλασιάζοντας κατά μέλη αφού όλα είναι θετικά, έχουμε:

$$1 < -\alpha\beta < 6 \Rightarrow -1 > \alpha\beta > -6 \Rightarrow -1 + 3 > \alpha\beta + 3 > -6 + 3 \Rightarrow -3 < \alpha\beta + 3 < 2$$

β)

- Είναι :

$$1 < \alpha < 3 \Rightarrow 1 < \alpha^2 < 9 \Rightarrow 2 < 2\alpha^2 < 18 \quad (3)$$

- Ομοίως:

$$-2 < \beta < -1 \Rightarrow 2 > -\beta > 1 \Rightarrow 4 > \beta^2 > 1 \Rightarrow -12 < -3\beta^2 < -3 \quad (4)$$

- Από τις σχέσεις (3) και (4), προσθέτοντας κατά μέλη, έχουμε:

$$-10 < 2\alpha^2 - 3\beta^2 < 15$$

20.

**ΛΥΣΗ**

- Είναι:

$$-1 \leq x \leq 3 \Rightarrow \begin{cases} x+1 \geq 0 \\ x-3 \leq 0 \Rightarrow 2x-6 \leq 0 \end{cases}$$

- Άρα η παράσταση γίνεται:

$$A = x+1 - (-x+3) + (-2x+6) = x+1+x-3-2x+6 = 4$$

21.

**ΛΥΣΗ**

- Είναι:

$$x < 4 < y \Rightarrow \begin{cases} 4-x > 0 \Rightarrow 8-2x > 0 \\ y-4 > 0 \\ x-y < 0 \end{cases} .$$

- Άρα η παράσταση γίνεται:

$$A = 8-2x-(y-4)+(-x+y) = 8-2x-y+4-x+y = 12-3x$$

22.

**ΛΥΣΗ**

$$|x+y+z| \leq |x+y| + |z| \leq |x| + |y| + |z| \leq 2+5+9=16$$

23.

**ΛΥΣΗ**

a)  $A = \frac{3x^2 + |x|}{1+3|x|} = \frac{3|x|^2 + |x|}{1+3|x|} = \frac{|x|(3|x|+1)}{1+3|x|} = |x| = \begin{cases} x, & \text{αν } x \geq 0 \\ -x, & \text{αν } x < 0 \end{cases}$

b)  $B = \frac{3|x|-9}{x^2-9} + \frac{x^2+3|x|}{x^2+6|x|+9} = \frac{3(|x|-3)}{(|x|-3)(|x|+3)} + \frac{|x|(|x|+3)}{(|x|+3)^2} = \frac{3+|x|}{|x|+3} = 1$

24.

**ΛΥΣΗ**

$$\text{α)} \ A = \frac{\sqrt[3]{9^4} \cdot \sqrt[6]{9} \cdot \sqrt{9^5}}{\sqrt[4]{9^2} \cdot \sqrt{9^3}} = \frac{9^{\frac{4}{3}} \cdot 9^{\frac{1}{6}} \cdot 9^{\frac{5}{2}}}{9^{\frac{2}{4}} \cdot 9^{\frac{3}{2}}} = \frac{9^{\frac{24}{6}}}{9^{\frac{4}{2}}} = 9^{4-2} = 81$$

$$\text{β)} \ B = \sqrt{2 \cdot \sqrt[4]{2 \cdot \sqrt[3]{2}}} \cdot \sqrt[24]{8} = \sqrt{2 \cdot \sqrt[4]{\sqrt[3]{2^3 \cdot 2}}} \cdot \sqrt[24]{2^3} = \\ \sqrt{2 \cdot \sqrt[12]{2^4}} \cdot \sqrt[24]{2^3} = \sqrt[12]{2^{12} \cdot 2^4} \cdot \sqrt[24]{2^3} = \sqrt[24]{2^{16}} \cdot \sqrt[24]{2^3} = \sqrt[24]{2^{16} \cdot 2^3} = \sqrt[24]{2^{19}}$$

25.

**ΛΥΣΗ**

$$\text{α)} \ A = \sqrt[4]{x \cdot \sqrt[3]{x}} = \sqrt[4]{\sqrt[3]{x^3 \cdot x}} = \sqrt[12]{x^4} = \sqrt[3]{x}$$

$$\text{β)} \ B = \sqrt[7]{x^4 \cdot \sqrt[3]{x^2 \cdot \sqrt[4]{x^7}}} = \sqrt[7]{x^4 \cdot \sqrt[3]{\sqrt[4]{x^8 \cdot x^7}}} = \sqrt[7]{x^4 \cdot \sqrt[12]{x^{15}}} = \\ \sqrt[7]{\sqrt[12]{x^{48} \cdot x^{15}}} = \sqrt[84]{x^{63}} = \sqrt[4]{x^3}$$

26.

**ΛΥΣΗ**

$$\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}-\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{14}-3} = \frac{\sqrt{7} \cdot (\sqrt{7}+\sqrt{2})}{(\sqrt{7}-\sqrt{2})(\sqrt{7}+\sqrt{2})} - \frac{\sqrt{14}+3}{(\sqrt{14}-3)(\sqrt{14}+3)} = \\ \frac{7+\sqrt{7} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{7}^2-\sqrt{2}^2} - \frac{\sqrt{14}+3}{\sqrt{14}^2-9} = \frac{7+\sqrt{14}}{7-2} - \frac{\sqrt{14}+3}{14-9} = \frac{7+\sqrt{14}-\sqrt{14}-3}{5} = \frac{4}{5}$$

27.

**ΛΥΣΗ**

$$\text{▪} \quad A = \frac{1}{\sqrt{x}-x} - \frac{1}{\sqrt{x}+x} = \frac{\sqrt{x}+x-(\sqrt{x}-x)}{(\sqrt{x}-x)(\sqrt{x}+x)} = \frac{\sqrt{x}+x-\sqrt{x}+x}{x-x^2} = \frac{2x}{x(1-x)} = \frac{2}{1-x}$$

▪ Για  $x=3$  γίνεται :

$$A = \frac{2}{1-3} = -1$$

28.

**ΛΥΣΗ**

$$\text{α)} \ A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-1}-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x}+\sqrt{x-1}} = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+\sqrt{x-1})+(\sqrt{x-1}-\sqrt{x})\sqrt{x-1}}{(\sqrt{x-1}-\sqrt{x})(\sqrt{x}+\sqrt{x-1})} = \\ \frac{x+\sqrt{x}\sqrt{x-1}+x-1-\sqrt{x}\sqrt{x-1}}{x-1-x} = \frac{2x-1}{-1} = -2x+1$$

$$\text{β)} \ B = \frac{\sqrt{2020}}{\sqrt{2019}-\sqrt{2020}} + \frac{\sqrt{2019}}{\sqrt{2020}+\sqrt{2019}} = -2 \cdot 2020 + 1 = -4039$$

29.

**ΛΥΣΗ**

a) Πρέπει  $x - 4 \geq 0$  και  $6 - x \geq 0$   
 $x \geq 4$   $x \leq 6$

Τελικά  $x \in [4, 6]$

β)

- Για  $x = 5$  έχουμε:  $A = \sqrt{5-4} + \sqrt{6-5} = 1+1=2$
- Άρα:

$$A^2 + A - 6 = 2^2 + 2 - 6 = 0$$

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3º: «ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 1ºυ ΒΑΘΜΟΥ»**

Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):

1. Σωστό

2. Σωστό

3. Λάθος

4. Σωστό

5. Λάθος

6. Σωστό

7. Σωστό

8. Λάθος

9. Σωστό

10. Λάθος

**Τα παρακάτω θέματα αποτελούν βασικές γνώσεις στο 3º Κεφάλαιο**

1.

**ΛΥΣΗ**

a)  $5x^2 - 4x = 3x^2 - 2x \Leftrightarrow$

$$2x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow$$

$$2x(x-1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$x = 0 \quad \text{ή} \quad x = 1$$

β)  $x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0 \Leftrightarrow$

$$x^2(x-2) - (x-2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$(x-2)(x^2-1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$x = 2 \quad \text{ή} \quad x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

γ)  $(x+2)^3 - 13(x+1) = 1 \Leftrightarrow$   
 $x^3 + 6x^2 + 12x + 8 - 13x - 13 - 1 = 0 \Leftrightarrow$   
 $x^3 + 6x^2 - x - 6 = 0 \Leftrightarrow$   
 $x^2(x+6) - (x+6) = 0 \Leftrightarrow$   
 $(x+6)(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow$   
 $x = -6 \quad \text{ή} \quad x = \pm 1$

δ)  $(x-5)^2 = 9(x+2)^2 \Leftrightarrow$   
 $x^2 - 10x + 25 = 9x^2 + 36x + 36 \Leftrightarrow$   
 $0 = 8x^2 + 46x + 11 \Leftrightarrow$   
 $0 = 8x^2 + 44x + 2x + 11 \Leftrightarrow$   
 $0 = 2x(4x+1) + 11(4x+1) \Leftrightarrow$   
 $0 = (4x+1)(2x+11) \Leftrightarrow$   
 $x = -\frac{1}{4} \quad \text{ή} \quad x = -\frac{11}{2}$

2.

**ΑΥΣΗ**

α)

- Πρέπει  $x \neq -5$  και  $x \neq +5$  και  $x \neq 0$

$$\frac{1}{x+5} - \frac{1}{(x+5)(x-5)} = \frac{2x}{x(x+5)} \Leftrightarrow$$

$$(x+5)(x-5) \frac{1}{x+5} - (x+5)(x-5) \frac{1}{(x+5)(x-5)} = (x+5)(x-5) \frac{2}{x+5} \Leftrightarrow$$

$$x-5-1=2(x-5) \Leftrightarrow$$

$$x-6=2x-10 \Leftrightarrow$$

$$4=x$$

β)

- Πρέπει  $x \neq -2$  και  $x \neq 2$

$$(x-2)(x+2) \frac{4}{x+2} - (x-2)(x+2) \frac{3x}{-(x-2)} = (x-2)(x+2) \frac{3x^2 - 8}{(x-2)(x+2)} \Leftrightarrow$$

$$4(x-2) + 3x(x+2) = 3x^2 - 8 \Leftrightarrow$$

$$4x - 8 + 3x^2 + 6x = 3x^2 - 8 \Leftrightarrow$$

$$10x = 0 \Leftrightarrow$$

$$x = 0$$

**γ)**

- Πρέπει  $x \neq -3$  και  $x \neq 3$

$$(x+3)(x-3) \frac{3x-1}{x+3} - (x+3)(x-3) \frac{3x-7}{x-3} = 0 \Leftrightarrow$$

$$(x-3)(3x-1) - (x+3)(3x-7) = 0 \Leftrightarrow$$

$$3x^2 - x - 9x + 3 - (3x^2 - 7x + 9x - 21) = 0 \Leftrightarrow$$

$$3x^2 - 10x + -3x^2 - 2x + 21 = 0 \Leftrightarrow$$

$$21 = 12x \Leftrightarrow$$

$$x = \frac{21}{12} = \frac{7}{4}$$

**3.****ΛΥΣΗ**

a)  $|2x - 1| - 5 = 3 \Leftrightarrow$

$$|2x - 1| = 8 \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} 2x - 1 = 8 \\ 2x - 1 = -8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{9}{2} \\ x = -\frac{7}{2} \end{cases}$$

b)  $\frac{|x+2|}{3} + \frac{1}{2} = 4 \stackrel{6}{\Leftrightarrow}$

$$2|x+2| + 3 = 24 \Leftrightarrow$$

$$2|x+2| = 21 \Leftrightarrow$$

$$|x+2| = \frac{21}{2} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x+2 = 11,5 \\ x+2 = -11,5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 9,5 \\ x = -13,5 \end{cases}$$

c)  $\frac{|4-x|}{2} + \frac{1}{3} = |x-4| \stackrel{6}{\Leftrightarrow}$

$$3|x-4| + 2 = 6|x-4| \Leftrightarrow$$

$$2 = 3|x-4| \Leftrightarrow$$

$$\frac{2}{3} = |x-4| \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x-4 = \frac{2}{3} \\ x-4 = -\frac{2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{14}{3} \\ x = \frac{10}{3} \end{cases}$$

**δ)**

$$|x+1|-2x=6 \Leftrightarrow$$

$$\begin{aligned} |x+1|-2x &= 6 & \text{ή} \\ |x+1| &= 2x+6 & \text{πρέπει } 2x+6 \geq 0 \Rightarrow x \geq -3 \\ x+1 &= 2x+6 & x+1 = -2x-6 \\ -5 &= x \text{ απορ.} & x = -\frac{7}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |x+1|-2x &= -6 \Leftrightarrow \\ |x+1| &= 2x-6 & \text{πρέπει } 2x-6 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3 \\ x+1 &= 2x-6 & x+1 = -2x+6 \\ x &= 7 & x = \frac{5}{3} \text{ απορ.} \end{aligned}$$

**4.****ΛΥΣΗ**

a)  $|x+4|-|3x-5|=0 \Leftrightarrow$

$$|x+4|=|3x-5| \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x+4=3x-5 \\ x+4=-3x+5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\frac{9}{2} \\ x=\frac{1}{4} \end{cases}$$

b)  $|2x-3|=x+1, \text{ πρέπει } x+1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -1$

$$\begin{cases} 2x-3=x+1 \\ 2x-3=-x-1 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x=4 \\ x=\frac{2}{3} \end{cases}$$

c)  $||x+2|-1|=3 \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} |x+2|-1=3 \\ |x+2|-1=-3 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} |x+2|=4 \Leftrightarrow \begin{cases} x+2=4 \\ x+2=-4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ x=-6 \end{cases} \\ |x+2|=-2, \text{ αδύνατη} \end{cases}$$

5.

**ΛΥΣΗ**

- $\lambda^2(x-1) = 2(2x-\lambda) \Leftrightarrow$   
 $\lambda^2x - \lambda^2 = 4x - 2\lambda \Leftrightarrow$   
 $\lambda^2x - 4x = \lambda^2 - 2\lambda \Leftrightarrow$   
 $(\lambda-2)(\lambda+2)x = \lambda(\lambda-2)$
- Άντας  $(\lambda-2)(\lambda+2) \neq 0 \Leftrightarrow \lambda \neq 2$  και  $\lambda \neq -2$   
 $x = \frac{\lambda(\lambda-2)}{(\lambda-2)(\lambda+2)} = \frac{\lambda}{(\lambda+2)}$
- Άντας  $(\lambda-2)(\lambda+2) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 2$  ή  $\lambda = -2$
- Για  $\lambda = 2$ :  $0x = 0$  αόριστη
- Για  $\lambda = -2$ :  $0x = 8$  αδύνατη

6.

**ΛΥΣΗ**

$$\begin{aligned} \lambda^2(x+1) &= 1 + \lambda x \Leftrightarrow \\ \lambda^2x + \lambda^2 &= 1 + \lambda x \Leftrightarrow \\ \lambda^2x - \lambda x &= 1 - \lambda^2 \Leftrightarrow \\ \lambda(\lambda-1)x &= (1+\lambda)(1-\lambda) \Leftrightarrow \\ \lambda(\lambda-1)x &= -(1+\lambda)(\lambda-1) \end{aligned}$$

Επομένως:

a) Πρέπει  $\lambda(\lambda-1) \neq 0 \Leftrightarrow \lambda \neq 0$  και  $\lambda \neq 1$

$$x = \frac{-(1+\lambda)(\lambda-1)}{\lambda(\lambda-1)} = \frac{-(1+\lambda)}{\lambda}$$

b) Πρέπει  $\lambda(\lambda-1) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 0$  ή  $\lambda = 1$

και  $-(1+\lambda)(\lambda-1) = 0 \Leftrightarrow \lambda = -1$  ή  $\lambda = 1$

Άρα  $\lambda = 1$ 

c) Πρέπει  $\lambda(\lambda-1) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 0$  ή  $\lambda = 1$

και  $-(1+\lambda)(\lambda-1) \neq 0 \Leftrightarrow \lambda \neq -1$  ή  $\lambda \neq 1$

Άρα  $\lambda = 0$

7.

**ΛΥΣΗ**

$$x^2 + (2\lambda + 1)x + \lambda^2 - 1$$

$$x^2 + (2\lambda + 1)x + \lambda^2 - 1$$

$$\Delta = (2\lambda + 1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (\lambda^2 - 1) = 4\lambda^2 + 4\lambda + 1 - 4\lambda^2 + 4 = 4\lambda + 5$$

Επομένως:

a) Αν  $\Delta > 0 \Rightarrow 4\lambda + 5 > 0 \Rightarrow \lambda > -\frac{5}{4}$  τότε:

$$x_{1,2} = \frac{-2\lambda - 1 \pm \sqrt{4\lambda + 5}}{2}$$

b) Αν  $\Delta = 0 \Rightarrow 4\lambda + 5 = 0 \Rightarrow \lambda = -\frac{5}{4}$  τότε:

$$x = \frac{-2\lambda - 1}{2}$$

c) Αν  $\Delta < 0 \Rightarrow 4\lambda + 5 < 0 \Rightarrow \lambda < -\frac{5}{4}$  τότε η εξίσωση είναι αδύνατη

8.

**ΛΥΣΗ**

$$\lambda^2 x + \lambda^2 = 16x + 4\lambda \Leftrightarrow$$

$$\lambda^2 x - 16x = 4\lambda - \lambda^2 \Leftrightarrow$$

$$(\lambda - 4)(\lambda + 4)x = -\lambda(\lambda - 4)$$

- Πρέπει  $(\lambda - 4)(\lambda + 4) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 4$  ή  $\lambda = -4$

και  $-\lambda(\lambda - 4) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 0$  ή  $\lambda = 4$

Άρα  $\lambda = 4$

- Πρέπει  $(\lambda - 4)(\lambda + 4) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 4$  ή  $\lambda = -4$

και  $-\lambda(\lambda - 4) \neq 0 \Leftrightarrow \lambda \neq 0$  και  $\lambda \neq 4$

Άρα  $\lambda = -4$

**Επιμέλεια: Βασιλάτος Κοσμάς**